

Dojenje i rizik od karcinoma dojke

Autor Anchika
Sunday, 11 April 2010

Karcinom dojke kao najčešći karcinom u žena generativne dobi godišnje odnese najviše života. To je i razlogom što se ulažu veliki naponi i trud, kako u rano otkrivanje, tako i u prevenciju same bolesti. Svaki aspekt života žene se proučava ne bi li se bolje znali kako se boriti s tom opakom bolešću.

Karcinom dojke kao najčešći karcinom u žena generativne dobi godišnje odnese najviše života. To je i razlogom što se ulažu veliki naponi i trud, kako u rano otkrivanje, tako i u prevenciju same bolesti. Svaki aspekt života žene se proučava ne bi li se bolje znali kako se boriti s tom opakom bolešću. Dokazano je da dojenje smanjuje rizik od razvoja karcinoma dojke u općoj populaciji žena, ali je li sa nasljednim oblicima? Nedavna studija je proučavala upravo to, može li se dojenjem smanjiti rizik za razvoj karcinoma dojke u žena koje imaju BRCA 1 i 2 mutacije.

BRCA gen je tumor supresorski gen, dakle njegovom mutacijom stanice abnormalno proliferiraju. BRCA mutacija je uzrok 5 % karcinoma dojke. Žena nositeljica ima 70-80 % šanse za razvoj karcinoma dojke tijekom života. U studiji su proučene žene sa dokazanom mutacijom BRCA 1 i BRCA 2 gena. Njihovo provođenje dojenja je proučeno ispunjavanjem upitnika. Zanimljivo je da je u slučaju BRCA 1 mutacije dojenje u trajanju najmanje godinu dana statistički značajno smanjilo pojavnost karcinoma dojke u ugroženoj skupini. Za BRCA 2 gen nema statistički značajne razlike. Ova studija je bar u nekom segmentu rasvijetlila ovu malignu bolest, a djelomično bi mogla i živote ugroženih žena. Kada su u pitanju te bolesti, svaki tražak nade je dobrodošlo.