

Djeca samoubojica i sami samoubojice

Autor Doc
Tuesday, 25 May 2010

Djeca èiji je roditelj poèinio samoubojstvo imaju veæi rizik da i sama poèine samoubojstvo ili da razviju neku od veæih psihijatrijskih poremeæaja. Rezultati dosad najveæe studije iz tog podruèja psihijatrije, pod vodstvom Johns Hopkins Children's Centra, objavljeni su u svibanjskom broju Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

Djeca èiji je roditelj poèinio samoubojstvo imaju veæi rizik da i sama poèine samoubojstvo ili da razviju neku od veæih psihijatrijskih poremeæaja. Rezultati dosad najveæe studije iz tog podruèja psihijatrije, pod vodstvom Johns Hopkins Children's Centra, objavljeni su u svibanjskom broju Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. Kako i kada jedan od roditelja umre ima veliki utjecaj na djetetovo kasnije stanje. Buduæi da su rezultati pokazali da samoubojstvo roditelja ima daleko jaèi utjecaj na djecu i mlade nego na asolescente, znanstvenici su zakljuèili da vaænu ulogu moraju imati i èimbenici okoliša te genetski faktori rizika. "Gubitak roditelja koji je poèinio samoubojstvo u ranoj djetetovoj dobi djeluje kao katalizator za samoubojstvo i razvoj psihièkih poremeæaja," rekla je voditeljica studije Holly C. Wilcox, psihijatrijski epidemiolog s Johns Hopkins Children's Centera. "Ipak, moguæe je da razvojni, ekološki i genetski faktori djeluju zajedno, te tako poveæavaju rizik." Prema znanstvenicima koji su vodili studiju dobre su vijesti da iako djeca imaju veæi rizik, veæina ih ipak ne umire uslijed samoubojstva. S druge strane, gentski faktori se mogu mijenjati. Studija je pokazala da vaænu preventijsku ulogu ima brzina i vrijeme intervencije nakon što roditelj poèini samoubojstvo. Stoga se i preporuèa pedijatrima da je to vrijeme u kojem moraju paæljivo pratiti i voditi djecu na psihijatrijsku procjenu te tamo gdje je potrebno i provoditi odgovarajuæu skrb. Isto tako kritiènom preventivnom mjerom se pokazala obiteljska podrška. Procjena je da u SAD-u, izmeðu 7.000 i 12.000 djece godišnje izgubi roditelja zbog samoubojstvo. Studijom su obraðeni stanovnici Švedske u posljednjih 30 godina, te su analizirani uèinci nepravodobne i / ili iznenadne smrti roditelja na djetetov razvoj.

Istraživani su s jedne strane odnos samoubojstva, psihijatrijske hospitalizacije i nasilan zloèin tijekom 30 godina u više od 500.000 švedske djece, tinejdæera i mladih odraslih osoba (mlaði od 25) koje su roditelja izgubile zbog samoubojstva, bolesti ili nezgode, dok je s druge strane bilo gotovo 4 milijuna djece, tinejdæera i mladih odraslih osoba koji su imali roditelje. Osobe koje su izgubili roditelja zbog samoubojstva dok su bila djeca ili tinejdæeri razvile su tri puta veæu vjerojatnost da i sami poèine samoubojstvo u usporedbi s djecom i tinejdæerima koji su imali roditelje. Meðutim, razlika nije naðena u riziku za poèinjenje samoubojstva kad su usporeðivali osobe koje su roditelja zbog samoubojstva izgubile nakon 18. godine. Djeca do 13 godina èiji je roditelj iznenada umro uslijed nesreæe imaju dva puta veæu vjerojatnost da æe umrijeti od samoubojstva u usporedbi s onima èiji su roditelji bili æivi, meðutim ova razlika nestaje u starijim skupinama. Djeca ispod 13 godina koja su izgubili roditelja od bolesti nisu imali poveæan rizik za samoubojstvo u usporedbi s djecom iste dobi kojima su roditelji bili æivi. Osim toga, osobe koje su izgubile roditelja zbog samoubojstva imale su gotovo dvostruko veæu vjerojatnost da æe biti hospitalizirane zbog depresije u usporedbi s onim koji su imali æive roditelje. Oni koji su izgubili roditelje zbog nesreæe ili bolesti imaju 30% odnosno 40% veæi rizik za hospitalizaciju. Studija pokazuje i da gubitak roditelja, bez obzira na uzrok, poveæava djetetov rizik za poèinjenje nasilnog kriminala. U istraþivanju nisu bila ukljuèena sumnjiva samoubojstva, kao niti djeca koja su veæ imala psihijatrijske smetnje u razvoju ili bsu bila tretirana prije smrti roditelja ili ambulantno.

Istraþivanje je financirao Nacionalni savez za istraþivanje shizofrenije i depresije, Nacionalnog instituta za zloupotrebe droga i švedski Research Council.